

ESTAÇÃO 1 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CLÍNICA MÉDICA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Cumprimenta o paciente simulado.	0		0,25
2. Exame abdominal: posiciona o paciente simulado com os braços ao longo do corpo e ergue a camiseta para o exame abdominal. Observação: é necessária a execução dos 2 procedimentos para a obtenção do ponto.	0		0,75
3. Palpação do fígado: realiza a palpação bimanual (posiciona a mão no gradeado costal direito e palpa, com a outra mão, o bordo hepático, solicitando que o paciente simulado inspire profundamente) em decúbito dorsal.	0		1,5
4. Palpação do baço: realiza, em uma das técnicas, palpação bimanual (fixa o gradeado costal esquerdo com uma mão e palpa com a outra) com o paciente simulado em decúbito dorsal e em inspiração profunda.	0		1,5
5. Palpação do baço: realiza, em uma das técnicas, palpação bimanual do baço com o paciente simulado em decúbito lateral direito, coloca o braço esquerdo dele atrás da cabeça, flexiona a perna esquerda dele e solicita inspiração profunda.	0		1,5
6. Hipótese diagnóstica: faz o diagnóstico de leucemia aguda ou leucose aguda.	0		1,5
7. Solicitação do procedimento: solicita aspirado de medula e/ou biópsia de medula óssea e/ou imunofenotipagem (citometria de fluxo) de sangue periférico.	0		1,5
8. Orientação sobre o procedimento ao paciente simulado: explica que o aspirado e a biópsia são feitos no osso/na medula óssea (sem necessidade de especificar local) e/ou que a imunofenotipagem (citometria de fluxo) é feita com coleta de sangue periférico.	0		1,5

ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CIRURGIA GERAL

Indicadores de avaliação		DESEMPENHO AVALIADO		
		Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
Avaliação primária (3,5 pontos)				
1	Identificou-se adequadamente ao paciente e utiliza, pelo menos, luva de procedimento.	0,0		0,2
2	(A) Reconheceu que o paciente está com via aérea pérvia.	0,0		0,3
3	Indicou a manutenção de máscara com oxigênio.	0,0		0,1
4	Identificou a necessidade inicial de manter o colar cervical.	0,0		0,1
5	(B) Demonstrou ou verbalizou o exame físico torácico relatando a adequada ventilação do paciente.	0,0		0,3
6	(C) Indicou monitorização multiparamétrica (ritmo cardíaco, FC, PA não invasiva, FR, SpO ₂ e temperatura).	0,0		0,3
7	Avaliou presença de sangramento externo.	0,0		0,1
8	Avaliou o estado hemodinâmico da vítima e notou sua estabilidade.	0,0		0,2
9	Indicou manter o acesso venoso periférico de grosso calibre.	0,0		0,2
10	Indicou a necessidade de restrição da reposição volêmica com solução cristalóide.	0,0		0,2
11	Fez menção à coleta de exames bioquímicos.	0,0		0,2
12	Indicou os exames a serem colhidos. (Hb/Ht/plaquetas, tipo sanguíneo e contraprova)	0,0		0,2
13	Indicou a administração de ácido tranexâmico (1g EV em bolus até 3 h no trauma e 1g EV em 8 h).	0,0		0,2
14	(D) Realizou a quantificação do escore de coma de Glasgow, e verbalizou sua normalidade (15).	0,0		0,3
15	(E) Preocupou-se e agiu na exposição do paciente devido ao risco de hipotermia.	0,0		0,3
16	Identificou o atraso na vacina antitetânica.	0,0		0,3

ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

Indicadores de avaliação		DESEMPENHO AVALIADO		
		Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
Abordagem ao membro/ferimento (2 pontos)				
17	Fez uso de paramentação (gorro, máscara, óculos de proteção e luvas estéreis).	0,0		0,5
18	Descobriu o curativo e notou/verbalizou a presença de fratura exposta de tíbia.	0,0		1,0
19	Manteve cobertura estéril e imobilização com tala aramada (uma articulação acima e uma abaixo do local da fratura).	0,0		0,5
Conduta inicial (2 pontos)				
20	Indicou analgesia endovenosa.	0,0		0,7
21	Removeu colar cervical, após exame físico local.	0,0		0,7
22	Indicou a remoção da prancha rígida, após exame do dorso com palpação da coluna.	0,0		0,6
Conduta diagnóstica e terapêutica (0,5 ponto)				
23	Orientou realização de raio X para planejamento cirúrgico.	0,0		0,2
24	Indicou o procedimento cirúrgico.	0,0		0,3
Orientações ao paciente simulado (2 pontos)				
25	Informou o que seria feito na sala de trauma.	0,0		0,3
26	Informou que deve iniciar antibiótico venoso.	0,0		0,3
27	Informou que será necessário cirurgia (lavagem e fixação externa).	0,0		1,0
28	Informou que o paciente ficará internado.	0,0		0,4

ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO PEDIATRIA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
Abordagem e anamnese			
1.1. Identifica-se e cumprimenta a mãe de maneira adequada.	0		0,5
1.2. Pergunta sobre as características da tosse paroxística: a) duração – acima de 20 dias; b) relação com o ciclo respiratório – tossidas rápidas e curtas (de cinco a dez) em uma única expiração; c) frequência – 30 a 40 episódios/dia. Inadequado: Não caracteriza a tosse. Parcialmente adequado: Investiga até duas características da tosse. Adequado: Investiga as três características da tosse.	0	1,0	2,0
1.3. Pergunta sobre a presença do guincho inspiratório, que ocorre logo após o acesso de tosse, durante uma inspiração profunda através da glote estreitada, podendo originar um som.	0		1,0
Interpretação e verbalização dos resultados dos exames complementares			
2.1. Verbaliza o resultado do hemograma: leucocitose com linfocitose.	0		0,5
2.2. Verbaliza a interpretação da radiografia de tórax: imagem de “coração borrado”, “felpudo” ou “franjado”, porque as bordas da imagem cardíaca não são nítidas, em decorrência dos infiltrados pulmonares.	0		1,5
3.1. Explica, com linguagem simples, o diagnóstico de coqueluche.	0		1,0
3.2. Explica sobre a necessidade de internação.	0		0,5
3.3. Orienta a mãe sobre a necessidade de uso de antibiótico.	0		1,0
3.4. Indica a notificação do caso de coqueluche.	0		0,5

ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
3.5 Investiga os comunicantes ou contatos íntimos (membros da família ou pessoas que vivem na mesma casa ou que frequentam habitualmente o local de moradia do caso) e indica quimioprofilaxia com azitromicina ou claritromicina. Inadequado: Não investiga os comunicantes ou contatos nem indica a quimioprofilaxia. Parcialmente adequado: Indica a quimioprofilaxia para comunicantes ou contatos sem especificar as opções de antibióticos. Adequado: Indica a quimioprofilaxia com azitromicina ou claritromicina para comunicantes ou contatos.	0	0,5	1,0
3.6. Pergunta se a mãe possui alguma dúvida.	0		0,5

ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS ESTAÇÃO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
1. Atendimento inicial e hipóteses diagnósticas			
1.1 Apresenta-se e pergunta o nome da paciente.	0		0,3
1.2 Realiza anamnese.	0		0,5
1.3 Analisa as causas* do sangramento uterino anormal. Inadequado: Cita menos de 4 causas do sistema PALM-COEIN**. Parcialmente adequado: Cita 4 causas do sistema PALM-COEIN. Adequado: Cita pelo menos 5 causas do sistema PALM-COEIN.*Neste item, não será atribuída pontuação à causa "gestação". **Causas de sangramento uterino anormal (PALM-COEIN): pólipos; adenomiose; leiomioma <i>malignancy</i> (câncer de endométrio); coagulação; distúrbio de ovulação; distúrbio de endométrio; iatrogenia; não determinado.	0	0,6	1,2
2. Exame físico			
2.1 Realiza exame ginecológico com espéculo e identifica o colo uterino e a origem do sangramento. Inadequado: Não realiza o exame ginecológico ou não identifica que o sangramento provém do colo uterino. Parcialmente adequado: Introduce e/ou retira o espéculo em posição horizontal ou aberto, mas identifica que o sangramento provém do colo uterino. Adequado: Introduce o espéculo em posição diagonal, girando para horizontal, abre o espéculo, expõe o colo uterino e identifica que o sangramento provém do colo. Retira o espéculo fazendo o movimento inverso.	0	0,5	1,0
2.2 Realiza toque vaginal.	0		0,4

ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Ginecologia e Obstetrícia

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
3. Solicitação de exames complementares na urgência			
3.1 Solicita beta-hCG.	0		1,2
3.2 Solicita hemograma.	0		1,2
4. Prescrição			
4.1 Prescreve anti-inflamatório.	0		0,4
4.2 Prescreve ácido tranexâmico.	0		0,4
4.3 Prescreve hidratação venosa.	0		0,4
4.4 Prescreve reposição de ferro.			1,0
5. Orientação final			
5.1 Solicita ecografia transvaginal. Inadequado: não solicita ecografia transvaginal ou também solicita outro exame de imagem da pelve. Adequado: solicita ecografia transvaginal e nenhum outro exame de imagem da pelve.	0		1,0
5.2 Não interna a paciente e a referencia ao ginecologista.	0		1,0

ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS ESTAÇÃO MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
A. Acolhimento			
1. Cumprimenta e identifica-se ao paciente.	0		0,25
2. Pergunta ao paciente o motivo da consulta.	0		0,25
3. Esclarece ao paciente que ele está com tuberculose e onde ela se instala.	0		0,50
4. Pergunta se o paciente está fazendo uso das medicações (adesão).	0		0,75
5. Pergunta quantos medicamentos o paciente está tomando por dia.	0		0,50
6. Pergunta o estado do paciente, ou como ele está se sentindo, ou se houve algum efeito colateral da medicação.	0		0,75
ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
B. Plano de cuidados			
7. Cita os nomes dos quatro medicamentos, na forma de dois tipos de comprimidos: Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamina e Etambutol (RHPE) e Rifampicina e Isoniazida (RH).	0		0,5
8. Explica o tratamento completo para TB 2RHZE/4RH: 2 meses de tratamento diário com RHZE, 4 comprimidos/dia; 4 meses de tratamento diário de RH, 4 comprimidos/dia.	0		1,0
9. Explica efeitos colaterais menores das medicações: gástricos (epigastria, dor abdominal, náuseas e vômitos), cutâneos (edema, irritação, acne e prurido) e outros (cefaleia, vertigem, insônia, ansiedade e artralgia). Inadequado: Não explica efeitos. Parcialmente adequado: Explica apenas um dos efeitos colaterais menores. Adequado: Explica dois ou mais efeitos colaterais.	0	0,5	1,5
10. Pergunta se há alguma dúvida e explica que os efeitos costumam passar sem precisar suspender a medicação. Inadequado: Não faz nenhuma pergunta. Parcialmente adequado: Cumpre apenas uma das tarefas.	0	0,5	1,0

ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

Adequado: Cumpre todas as tarefas.			
11. Orienta a ingestão com água dos 4 comprimidos de RHPE na UBS.	0		0,5
12. Explica que o paciente não deve ingerir a medicação com álcool, pelo risco de agressão ao fígado e piora dos sintomas adversos.	0		0,5
13. Orienta como será o TDO: a - (quem) membro da Estratégia da Saúde da Família (ACS, enfermeiro, técnico de enfermagem ou médico); b - (como) horário de ida à UBS ou visita domiciliar; c - (especificidade) como se dará a tomada da medicação nos fins de semana e feriados. Inadequado: Não orienta. Parcialmente adequado: Faz até duas orientações das três listadas acima. Adequado: Faz as três orientações.	0	0,5	1,5
14. Orienta o paciente a não retornar ao trabalho.	0		0,5

ESTAÇÃO 6 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Clínica Médica

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CLÍNICA MÉDICA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Cumprimenta o paciente e se apresenta.	0,0		0,25
2. Pergunta sobre o uso de medicação, atual ou anterior.	0,0		1,00
3. Pergunta sobre hospitalização prévia.	0,0		1,00
4. Pergunta sobre doenças crônicas.	0,0		1,00
5. Solicita exames laboratoriais e radiografia de tórax. Inadequado: Não pede exames espontaneamente. Parcialmente adequado: Solicita apenas um exame (impresso 2 ou 3). Adequado: Solicita exames laboratoriais e radiografia de tórax.	0,0	0,5	1,25
6. Interpreta o hemograma, que apresenta leucocitose com desvio à esquerda.	0,0		1,00
7. Interpreta a radiografia de tórax, que demonstra uma imagem com padrão alveolar ou consolidação em terço inferior do hemitórax direito.	0,0		1,50
8. Informa ao paciente o diagnóstico de pneumonia.	0,0		1,50
9. Informa que o tratamento será ambulatorial.	0,0		1,50

ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Cirurgia Geral

PLANILHA DE CORREÇÃO ESTAÇÃO CIRURGIA GERAL

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
Anamnese e exame físico (2 pontos)			
1. Identifica-se adequadamente para a paciente. Inadequado: Não se identifica. Adequado: Identifica-se.	0,0		0,2
2. Realiza anamnese, perguntando sobre sinais de risco para anexite/salpingite (corrimento vaginal, vida sexual ativa, história prévia de infecção sexualmente transmissível). Inadequado: Não pergunta sobre os assuntos. Parcialmente adequado: Pergunta somente um dos itens. Adequado: Pergunta corretamente todas as possibilidades.	0,0	0,2	0,4
3. Realiza anamnese, perguntando sobre possibilidade de gestação/gravidez ectópica/rota (data da última menstruação, uso de anticoncepção, atividade sexual recente). Inadequado: Não pergunta sobre os assuntos. Parcialmente adequado: Pergunta somente um dos itens. Adequado: Pergunta corretamente todas as possibilidades.	0,0	0,2	0,4
4. Exame físico com dor à palpação superficial e profunda, com descompressão brusca positiva (Blumberg). Inadequado: Não realiza o exame adequadamente. Adequado: Realiza o exame adequadamente.	0,0		1,0

ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Cirurgia Geral

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
Investigação diagnóstica (3 pontos)			
5. Explica adequadamente hipóteses diagnósticas para a paciente simulada (anexite/salpingite aguda <i>versus</i> apendicite aguda; torção/ruptura de cisto ovariano). Inadequado: Não explica as hipóteses mencionadas. Adequado: Explica adequadamente as hipóteses mencionadas.	0,0		1,0
6. Solicita a realização de exame ginecológico (especular e toque vaginal). Inadequado: Não solicita o exame. Adequado: Solicita o exame.	0,0		0,5
7. Solicita os exames complementares (bioquímicos e de imagem) como plano diagnóstico. Inadequado: Não solicita β -HCG, hemograma nem ultrassonografia. Parcialmente adequado: Solicita somente um exame (β -HCG, hemograma ou ultrassonografia). Adequado: Solicita pelo menos dois exames (β -HCG e/ou hemograma e/ou ultrassonografia).	0,0	0,25	0,5
8. Interpreta de maneira adequada os exames bioquímicos. Inadequado: Interpreta todos os exames como normais ou não interpreta nenhum exame, por não os ter solicitado. Parcialmente adequado: Interpreta o HMG como normal ou o PCR como normal. Adequado: Interpreta HMG com leucocitose, com desvio à esquerda, e PCR aumentados.	0,0	0,25	0,5
9. Interpreta de maneira adequada o ultrassom, definindo o diagnóstico de apendicite aguda. Inadequado: Não define o diagnóstico a partir do ultrassom. Adequado: Define o diagnóstico a partir do ultrassom.	0,0		0,5

ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Cirurgia Geral

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
Conduta terapêutica (2 pontos)			
10. Solicita autorização (termo de consentimento informado) à paciente simulada para internação e realização de procedimento cirúrgico de emergência (apendicectomia). Inadequado: Não solicita a autorização. Adequado: Solicita a autorização.	0,0		1,0
11. Inicia medidas de suporte adequadamente (jejum, repouso no leito, hidratação endovenosa, analgesia). Inadequado: Não orienta nenhuma dessas medidas. Parcialmente adequado: Orienta uma ou duas medidas. Adequado: Orienta pelo menos três medidas.	0,0	0,5	1,0
Respostas às dúvidas da paciente simulada (3 pontos)			
12. Responde adequadamente sobre o apêndice, sua localização e sua função. Inadequado: Não responde corretamente nenhuma pergunta. Parcialmente adequado: Responde corretamente até duas perguntas. Adequado: Responde corretamente as três perguntas.	0,0	0,5	1,0
13. Esclarece se a via de acesso pode ser laparoscópica e/ou aberta. Inadequado: Não esclarece. Parcialmente adequado: Define somente uma via: aberta ou por vídeo. Adequado: Esclarece que o acesso pode ser feito por qualquer uma das duas vias, com preferência pelo vídeo, se possível.	0,0	0,5	1,0
14. Responde sobre o uso de antibiótico para cobertura de gram-negativo (aminoglicosídeo ou cefalosporina de 2. ^a ou 3. ^a) e anaeróbio (metronidazol ou clindamicina). Inadequado: Não responde sobre os antibióticos e os tipos. Parcialmente adequado: Responde, de forma incompleta ou parcialmente correta, sobre os antibióticos e os tipos. Adequado: Responde corretamente sobre os antibióticos e os tipos.	0,0	0,5	1,0

ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO PEDIATRIA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
Abordagem, anamnese e exame físico			
1.1. Identifica-se e cumprimenta a paciente simulada de maneira adequada.	0		0,5
1.2. Realiza abordagem da dor, perguntando: (a) quando começou; (b) o que foi feito para melhorar. Inadequado: Não faz abordagem de nenhum dos parâmetros – (a) nem (b). Parcialmente adequado: Pergunta apenas um dos parâmetros – (a) ou (b). Adequado: Pergunta sobre os dois parâmetros – (a) e (b).	0	0,5	1,0
1.3. Pergunta se o paciente teve febre.	0		0,5
1.4. Pergunta se o paciente teve outros sintomas.	0		0,25
1.5. Pergunta desde quando o paciente tem o diagnóstico de anemia falciforme.	0		0,25
1.6 Pergunta se o paciente faz acompanhamento com especialista (hematologista).	0		0,25
1.7 Pergunta se o paciente teve outras crises.	0		0,25
1.8 Pergunta sobre a frequência das crises.	0		0,25
1.9 Pergunta se o paciente precisou de atendimento de emergência por conta das crises.	0		0,25
1.10. Pergunta se o paciente tem alergia a algum medicamento.	0		1,0
1.11 Pergunta sobre o nível de hemoglobina basal.			0,5
1.12. Pergunta se o paciente já recebeu hemotransusão.	0		0,5
1.13. Pergunta se o paciente foi esplenectomizado.	0		0,5
Abordagem diagnóstica			
2.1. Informa à paciente simulada que o diagnóstico é de crise álgica ou de dor, devido à anemia falciforme.	0		1,0

ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Pediatria

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
Conduta e orientação do plano de cuidados			
3.1. Informa a paciente simulada sobre: (a) a necessidade de internação; e (b) o motivo da internação (o paciente não melhorou ou não vai melhorar com o tratamento domiciliar). Inadequado: Não indica internação. Parcialmente adequado: Indica a internação, e não informa o motivo. Adequado: Indica a internação e informa o motivo.	0	0,5	1,0
3.2. Orienta a paciente simulada sobre a necessidade de hidratação oral ou venosa.	0		0,5
3.3. Informa que administrará as seguintes medicações: dipirona e diclofenaco (via parenteral) associado à codeína (via oral) ou morfina (via endovenosa).	0		1,0
3.4. Pergunta se a paciente simulada possui alguma dúvida.	0		0,5

ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
1. Atendimento inicial			
1.1 Apresenta-se e cumprimenta a paciente.	0		0,3
2. Demonstração de exame físico e procedimentos			
2.1 Avalia o nível de consciência da paciente.	0		1,0
2.2 Acomoda a paciente no leito e a coloca com as pernas elevadas. Inadequado: Não faz nenhum desses procedimentos. Parcialmente adequado: Somente acomoda a paciente no leito. Adequado: Faz os dois procedimentos mencionados.	0	0,2	0,5
2.3 Checa pulsos: carotídeo e periféricos. Inadequado: Não chega os pulsos da paciente. Parcialmente adequado: Checa somente os pulsos periféricos ou o carotídeo. Adequado: Checa os pulsos periféricos e o carotídeo.	0	0,2	0,4
2.4 Checa a perfusão periférica.	0		0,4
2.5 Avalia a coloração das mucosas.	0		0,4
2.6 Avalia a involução uterina. Inadequado: Não palpa o útero. Adequado: Palpa o útero.	0		1,6
2.7 Avalia os lóquios. Inadequado: Não pergunta nem verifica. Parcialmente adequado: Somente pergunta, sem verificar. Adequado: Verifica os lóquios.	0	0,5	1,6

ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Ginecologia e Obstetrícia

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
3. Solicitação de exames (PA e complementares)			
3.1 Refere que deve aferir a pressão arterial.	0		0,8
3.2 Indica exame de glicemia imediato.	0		1,0
3.3 Não solicita outros exames. Inadequado: solicita outros exames Adequado: não solicita outros exames	0		0,4
4. Orientações			
4.1 Explica para a puérpera o quadro clínico e as causas do episódio de lipotimia. Inadequado: Não explica ou dá outro diagnóstico. Adequado: Explica que houve queda temporária da pressão e que não há sinais de hemorragia ou qualquer complicação.	0		1,2
4.2 Orienta como deve ser a mobilização da paciente para sair do leito. Inadequado: Diz que a paciente NÃO pode se levantar ou não orienta como deve proceder. Adequado: Diz que a paciente PODE se levantar, mas deve primeiro sentar-se e não se levantar de forma abrupta.	0		0,4

ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADO	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
A. Acolhimento			
1. Cumprimenta e apresenta-se ao adolescente.	0		0,25
2. Questiona sobre insônia.	0		0,25
3. Questiona sobre necessidades ampliadas de saúde para além da insônia, entendendo a possibilidade de quadro de violência.	0		2,0
4. Realiza abordagem centrada no paciente, incluindo escuta ativa, e estabelece relação de confiança com o paciente. Inadequado: Interrompe frequentemente o paciente. Parcialmente adequado: Realiza escuta ativa, mas não avança no estabelecimento de vínculo com o paciente. Adequado: Realiza escuta ativa e estabelece vínculo (inclina-se para frente, olha nos olhos do paciente e indaga as causas dos problemas ampliados de saúde do paciente).	0	0,75	1,50
B. Diagnóstico e plano de cuidados			
5. Identifica e notifica a violência física. Inadequado: Não identifica e não notifica. Parcialmente adequado: Somente identifica ou notifica. Adequado: Identifica e notifica.	0	0,25	0,50
6. Identifica e notifica a violência financeira. Inadequado: Não identifica e não notifica. Parcialmente adequado: Somente identifica ou notifica. Adequado: Identifica e notifica.	0	0,25	0,50

ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADO	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
7. Busca auxílio com equipe multi/interprofissional (assistência social e psicologia) para realizar os encaminhamentos para a rede de apoio.	0		2,0
8. Explica as atribuições da assistência social.	0		0,5
9. Explica as atribuições da psicologia.	0		0,5
10. Explica sobre a rede de apoio (CRAS e CAPS) para acolher o paciente.	0		1,25
11. Relata sobre o sigilo do caso para o paciente.	0		0,75